

На правах рукописи

Гусев Сергей Валентинович

РЕШЕТКА МНОГООБРАЗИЙ МОНОИДОВ

01.01.06 — математическая логика, алгебра и теория чисел

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Екатеринбург
2019

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».

Научный руководитель: Верников Борис Муневич,
доктор физико-математических наук, доцент

Официальные оппоненты: Пинус Александр Георгиевич,
доктор физико-математических наук, профессор
Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический
университет», профессор кафедры алгебры
и математической логики

Коробков Сергей Самсонович,
кандидат физико-математических наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования «Уральский
государственный педагогический университет»,
доцент кафедры высшей математики и
методики преподавания математики

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный
педагогический университет»

Защита диссертации состоится 23 августа 2019 г. в 15:30 на заседании диссертационного совета Д 003.015.02 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН» по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга 4.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН», <http://math.nsc.ru>.

Автореферат разослан «__» _____ 2019 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат физ.-мат. наук



А. И. Стукачев

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Одним из основных направлений современной общей алгебры является изучение многообразий алгебр. Этому направлению посвящено большое количество монографий и обзорных статей. Совокупность всех многообразий алгебр одного и того же типа образует решетку относительно включения. Исследование этой решетки относится к числу важнейших направлений изучения многообразий. Отметим, что исследование решеток многообразий естественно вписывается в более общий подход, связанный с рассмотрением производных решеток алгебраических объектов — таких, как решетки подалгебр, конгруэнций и т.п.

В частности, с начала 60-х годов прошлого века активно изучается решетка многообразий полугрупп, которую мы будем обозначать через SEM . Число работ, полностью или частично посвященных этой решетке, в настоящее время исчисляется несколькими сотнями. Результаты, полученные на начальном этапе изучения решетки SEM , приведены в обзорах [1, 9]. Более поздний обзор [6] отражает состояние дел в обсуждаемой области, близкое к современному. Не так давно вышел еще один обзор [26], посвященный не всей решетке SEM , а только ее специальным элементам.

На этом фоне резким контрастом выглядит крайне незначительное число работ, в которых изучается решетка всех многообразий моноидов, которую мы будем обозначать через MON (говоря о многообразиях моноидов, мы имеем в виду, что 0-арная операция, выделяющая единицу, входит в сигнатуру). По существу, можно назвать всего несколько работ, полностью или в существенной степени посвященных этой решетке. Речь идет о заметке Т.Хида [12], в которой описана решетка многообразий коммутативных моноидов, статье Д.Поллака [21], в которой, среди прочих результатов, построен пример многообразия моноидов, не имеющего покрытий в решетке MON , и работе Ш.Висмат [30], в которой описана решетка многообразий идемпотентных моноидов.

В последнее время ситуация начала постепенно меняться. В работах ряда авторов (в первую очередь, М.Джексона и Э.Ли), посвя-

щенных в основном изучению тождеств в моноидах, появляются и промежуточные результаты, относящиеся к решеткам многообразий (см., например, [13, 16–20, 31]). В основном они представляют собой описание решеток подмногообразий некоторых конкретных многообразий моноидов. В частности, в [16] построен, по-видимому, первый пример многообразия моноидов с немодулярной решеткой подмногообразий. А в недавней статье М.Джексона и Э.Ли [14] получен уже некоторый результат о решетке многообразий моноидов, представляющий несомненный самостоятельный интерес. А именно, в этой работе построены многообразия моноидов $\mathbf{X}$ и $\mathbf{Y}$ такие, что решетки их подмногообразий конечны, а решетка подмногообразий их объединения $\mathbf{X} \vee \mathbf{Y}$ континуальна и не удовлетворяет условию максимальности. Более того, из доказательств работы [14] легко вытекает, что последняя решетка не удовлетворяет и условию минимальности.

При изучении решетки многообразий полугрупп большое внимание уделялось рассмотрению ограничений, формулируемых в терминах тождеств (см. [6, §11]). Поэтому изучение решетки $\mathbf{MON}$ естественно начать с рассмотрения такого типа ограничений.

Как мы уже упоминали выше, решетка $\mathbf{MON}$ не является модулярной. Однако до последнего времени не было известно, удовлетворяет ли эта решетка какому-либо нетривиальному тождеству. Первый из основных результатов данной диссертации дает отрицательный ответ на этот вопрос (см. теорему 1 и следствие 1 ниже).

Обсудим этот результат подробнее. Многообразие моноидов называется *надкоммутативным*, если оно содержит многообразие всех коммутативных моноидов. Ясно, что совокупность всех надкоммутативных многообразий моноидов образует подрешетку в решетке всех многообразий моноидов. Мы будем обозначать эту подрешетку через $\mathbf{OC}$. Как и в случае полугрупп, решетка $\mathbf{MON}$ является дизъюнктивным объединением решетки $\mathbf{OC}$ и решетки *периодических* многообразий (т.е. многообразий, состоящих из периодических моноидов). В диссертации доказано отсутствие нетривиальных тождеств в решетке $\mathbf{OC}$, откуда, в частности, следует отсутствие нетривиальных тождеств во всей решетке $\mathbf{MON}$.

Для сравнения заметим, что отсутствие нетривиальных тождеств

в решетке многообразий полугрупп было доказано еще в 1971 г. в двух работах С.Барриса и Э.Нельсон [7, 8]. Решетка надкоммутативных многообразий полугрупп также не удовлетворяет никакому нетривиальному тождеству — это доказано М.В.Волковым в [28].

После доказательства отсутствия нетривиальных тождеств в решетке $\mathbf{MON}$ естественно начать изучение многообразий моноидов с модулярной или дистрибутивной решеткой подмногообразий. Поскольку решетка $\mathbf{MON}$ пока изучена слабо, трудно рассчитывать на полное решение соответствующих задач в ближайшее время. В качестве первого шага в этом направлении представляется естественным рассмотреть предельное усиление тождества дистрибутивности, а именно — свойство быть цепью. Многообразие, решетка подмногообразий которого является цепью, прямо называть *цепным*. Для большинства классических типов алгебр задача описания цепных многообразий решена 35–40 и более лет назад. В частности, негрупповые цепные многообразия полугрупп описаны Е.В.Сухановым в 1982 г. [5], а локально конечные цепные многообразия групп — В.А.Артамоновым в 1978 г. [2]. Отметим, что задача описания произвольных цепных многообразий групп представляется трансцендентно сложной. Это вытекает из результатов П.А.Кожевникова [15], согласно которым существует континуум периодических не локально конечных многообразий групп, решетка подмногообразий которых является 3-элементной цепью.

Отдельные нетривиальные примеры цепных многообразий моноидов появлялись в некоторых работах в процессе доказательств основных результатов (см., в частности, [13, 16, 19]). Однако систематически цепные многообразия моноидов до последнего времени не изучались. В диссертации получено полное описание негрупповых цепных многообразий моноидов (см. теорему 2 и следствие 2 ниже). Отметим, что этот результат оказался весьма трудоемким: его доказательство занимает около 70 страниц.

В диссертации рассматривается еще несколько ограничений, связанных с тождествами дистрибутивности и модулярности. Речь идет о специальных элементах в решетке $\mathbf{MON}$. Напомним определения тех типов специальных элементов, которые будут возникать ниже.

Элемент x решетки L называется *нейтральным*, если

$$\forall y, z \in L: (x \vee y) \wedge (y \vee z) \wedge (z \vee x) = (x \wedge y) \vee (y \wedge z) \vee (z \wedge x);$$

костандартным, если

$$\forall y, z \in L: (x \wedge y) \vee z = (x \vee z) \wedge (y \vee z);$$

кодистрибутивным, если

$$\forall y, z \in L: x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z);$$

модулярным, если

$$\forall y, z \in L: y \leq z \longrightarrow (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee y;$$

верхнемодулярным, если

$$\forall y, z \in L: y \leq x \longrightarrow x \wedge (y \vee z) = y \vee (x \wedge z).$$

Нижнемодулярные элементы определяются двойственно к верхнемодулярным. Хорошо известно, что элемент $x \in L$ нейтрален тогда и только тогда, когда для всех $y, z \in L$ подрешетка в L , порожденная x , y и z , дистрибутивна (см., например, [10, теорема 254]). Нейтральные элементы играют важную роль в общей теории решеток. В частности, элемент a является нейтральным элементом решетки L тогда и только тогда, когда L разложима в подпрямое произведение главного идеала и главного фильтра, порожденных элементом a (см., например, [10, теорема 254]). Таким образом, знание нейтральных элементов решетки позволяет судить о строении этой решетки в целом. Очевидно, что всякий нейтральный элемент нижнемодулярен и костандартен одновременно; всякий костандартный модулярен; всякий кодистрибутивный верхнемодулярен. Хорошо известно также, что всякий костандартный элемент кодистрибутивен (см., например, [10, теорема 253]). Некоторую дополнительную информацию о специальных элементах в произвольных решетках можно найти в [10, раздел III.2].

К настоящему времени получено много интересных и глубоких результатов о специальных элементах решетки $\mathbf{SEM}$ (см. обзоры [6, § 14] и [26], а также недавние работы [11, 22–24, 27]). В частности, нейтральные элементы решетки $\mathbf{SEM}$ были полностью описаны М.В.Волковым в [29, предложение 4.1], а Б.М.Верников в [4, теорема 1.3] доказал, что многообразие полугрупп является костандартным элементом решетки $\mathbf{SEM}$ тогда и только тогда, когда оно является нейтральным элементом этой решетки. Кодистрибутивные элементы решетки $\mathbf{SEM}$ изучались в работе [4], а верхнемодулярные — в [3, 25].

Специальные элементы решетки $\mathbf{MON}$ до настоящего времени не изучались. В диссертации полностью описаны нейтральные и костандартные элементы этой решетки (теоремы 3 и 4 ниже). Кроме того, нами получена существенная информация о кодистрибутивных и верхнемодулярных элементах этой решетки (предложения 1 и 2 ниже).

Целью работы является исследование тождеств и родственных им ограничений в решетке многообразий моноидов, в том числе специальных элементов этой решетки.

Задачи исследования. Исходя из сказанного выше, можно выделить следующие конкретные задачи, решению которых посвящена диссертация:

- 1) выяснить, удовлетворяет ли решетка многообразий моноидов какому-либо нетривиальному тождеству;
- 2) описать негрупповые цепные многообразия моноидов;
- 3) описать нейтральные элементы решетки многообразий моноидов;
- 4) описать костандартные элементы той же решетки.

Методология и методы исследования. В работе применяются методы теории полугрупп, универсальной алгебры, теории решеток и комбинаторики слов.

Степень достоверности. Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием научно-обоснованных методов с опорой на основополагающие теоретические положения в области математики, на фундаментальные работы по теории полугрупп, теории решеток и теории многообразий, использованием общеалгебраических и специальных методов исследований в области теории полугрупп, универсальной алгебры, теории решеток и комбинаторики слов.

Научная новизна. Все результаты диссертации являются новыми.

Теоретическая и практическая значимость. Диссертационная работа носит теоретический характер. Полученные результаты могут быть использованы в теории полугрупп и теории многообразий. Результаты, полученные в диссертации, значительно расширяют круг наших знаний о строении решетки многообразий моноидов. Для решения рассмотренных в диссертации задач потребовалось найти критерии выполнимости тождества (т.е. решить проблему равенства слов) в целом ряде конкретных многообразий моноидов. Для этого в диссертации разработан метод, основанный на целом ряде понятий, связанных с комбинаторикой слов (k -разложение слова, k -блоки и k -разделители слова, глубина буквы в слове и др.). Эти понятия введены и изучены в диссертации (рассмотрению их свойств посвящен раздел 1.2). Нам представляется, что потенциал этого подхода к изучению многообразий моноидов далеко не исчерпан задачами, рассмотренными в диссертации. Он может оказаться полезным как при рассмотрении других задач, связанных с решеткой многообразий моноидов, так и при изучении вопросов о конечной и бесконечной базируемости моноидов.

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся:

- 1) утверждение об отсутствии нетривиальных тождеств в решетке надкоммутативных многообразий моноидов, а значит, и в решетке всех моноидных многообразий; опубликовано в статье [32];

- 2) полное описание всех негрупповых цепных многообразий моноидов; опубликовано в статье [34];
- 3) полное описание нейтральных элементов решетки всех многообразий моноидов; опубликовано в статье [33];
- 4) полное описание костандартных элементов той же решетки; опубликовано в статье [33].

Апробация результатов работы. Результаты диссертации были представлены на Международной конференции «Группы и графы, алгоритмы и автоматы» (Екатеринбург, 2015), Международной конференции «Группы и графы, метрики и многообразия» (Екатеринбург, 2017), Международной конференции «Мальцевские чтения» (Новосибирск, 2017), Международной молодежной школе-конференции «Современные проблемы математики и ее приложений» (Екатеринбург, 2018), 56-й летней школе по алгебре и упорядоченным множествам (Шпиндлерув Млын, Чехия, 2018). Кроме того, все результаты диссертации докладывались на Екатеринбургском семинаре «Алгебраические системы» (2016–2019).

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь работ [32–38]. Из них три работы опубликованы в журналах из списка ВАК [32–34]. Одна работа написана совместно с Б.М.Верниковым [34]. В этой работе постановка задачи, указание на основные идеи и методы доказательства и усовершенствование первоначального варианта изложения принадлежат Б.М.Верникову, а само доказательство найдено диссертантом.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех параграфов, заключения и списка литературы. Объем диссертации составляет 105 страниц. Библиографический список содержит 75 наименований.

Краткое содержание работы

Во введении приводится обзор исследований по проблематике, которой посвящена диссертация, определены цели и задачи работы, кратко описаны результаты, полученные автором в решении поставленных задач.

В §1 приводятся все необходимые определения, обозначения и предварительные результаты. Некоторые из этих результатов являются новыми и принадлежат диссертанту. В частности, в этом параграфе вводится ряд новых понятий, связанных с комбинаторикой слов (таких, как k -разложение слова в произведение k -блоков и k -разделителей, глубина буквы в слове и др.), и изучены их свойства. Эти понятия и результаты играют ключевую роль в §3 диссертации

Основным результатом §2 является

Теорема 1. *Решетка надкоммутативных многообразий моноидов не удовлетворяет никакому нетривиальному тождеству.*

Очевидно, что из теоремы 1 вытекает

Следствие 1. *Решетка MON не удовлетворяет никакому нетривиальному тождеству.*

В §3 диссертации дается полное описание негрупповых цепных многообразий моноидов. Для формулировки этого результата нам необходимо ввести некоторые определения и обозначения. Через F обозначается абсолютно свободная полугруппа счетного ранга над некоторым алфавитом. Как обычно, элементы полугруппы F будем называть *словами*, а элементы алфавита — *буквами*. И слова, и буквы будут обозначаться маленькими латинскими буквами, но, в отличие от букв, слова, заведомо не являющиеся буквами или не обязанные ими быть, выделяются жирным шрифтом. Через F^1 будем обозначать полугруппу F с внешнеприсоединенной единицей, которую мы будем трактовать как пустое слово. Две части тождества мы будем соединять знаком $\approx$, а обычным знаком равенства будет, среди прочего, обозначаться отношение равенства на моноиде F^1 . Для

произвольного $q \in \mathbb{N}$ обозначим через S_q симметрическую группу на множестве $\{1, 2, \dots, q\}$. Если $\pi, \tau \in S_q$, то положим

$$\mathbf{w}_q(\pi, \tau) = \left(\prod_{i=1}^q z_i t_i \right) x \left(\prod_{i=1}^q z_{\pi(i)} z_{q+\tau(i)} \right) x \left(\prod_{i=q+1}^{2q} t_i z_i \right),$$

$$\mathbf{w}'_q(\pi, \tau) = \left(\prod_{i=1}^q z_i t_i \right) x^2 \left(\prod_{i=1}^q z_{\pi(i)} z_{q+\tau(i)} \right) \left(\prod_{i=q+1}^{2q} t_i z_i \right).$$

Через σ_1 обозначим тождество $xyzxty \approx yxzxtu$, а через σ_2 — двойственное к нему тождество. Через $\text{var } \Sigma$ обозначается многообразие моноидов, заданное системой тождеств Σ . Зафиксируем обозначения для следующих многообразий:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_n &= \text{var}\{x^n \approx x^{n+1}, xy \approx yx\}, \\ \mathbf{D} &= \text{var}\{x^2 \approx x^3, x^2y \approx yx^2, \sigma_1, \sigma_2, xzxyty \approx xzyxty\}, \\ \mathbf{K} &= \text{var}\{xyx \approx xyx^2, x^2y^2 \approx y^2x^2, x^2y \approx x^2yx\}, \\ \mathbf{L} &= \text{var}\{x^2y \approx yx^2, xyxzx \approx x^2yz, \sigma_1, \sigma_2, \\ &\quad \mathbf{w}_q(\pi, \tau) \approx \mathbf{w}'_q(\pi, \tau) \mid q \in \mathbb{N}, \pi, \tau \in S_q\}, \\ \mathbf{LRB} &= \text{var}\{xy \approx xyx\}, \\ \mathbf{N} &= \text{var}\{x^2y \approx yx^2, x^2yz \approx xyxzx, \sigma_2, xzxyty \approx xzyxty\}, \\ \mathbf{RRB} &= \text{var}\{yx \approx xyx\}, \end{aligned}$$

где $n \geq 2$. Через $\overleftarrow{\mathbf{X}}$ обозначается многообразие моноидов, двойственное к многообразию $\mathbf{X}$ (т.е. состоящее из моноидов, антиизоморфных моноидам из $\mathbf{X}$).

Основным результатом §3 является

Теорема 2. *Негрупповое многообразие моноидов является цепным тогда и только тогда, когда оно содержится в одном из многообразий $\mathbf{C}_n$ для некоторого $n \geq 2$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{K}$, $\overleftarrow{\mathbf{K}}$, $\mathbf{L}$, $\mathbf{LRB}$, $\mathbf{N}$, $\overleftarrow{\mathbf{N}}$ и $\mathbf{RRB}$.*

Из доказательства теоремы 2 можно извлечь полный список всех негрупповых цепных многообразий моноидов. Для того, чтобы сформулировать соответствующее утверждение, нам потребуется еще несколько обозначений. Во всех этих обозначениях $k \in \mathbb{N}$ и $1 \leq m \leq k$.

Положим $\mathbf{b}_{k,m} = x_{k-1}x_kx_{k-2}x_{k-1} \cdots x_{m-1}x_m$ и $\mathbf{b}_k = \mathbf{b}_{k,1}$; будем полагать также, что $\mathbf{b}_0$ является пустым словом. Введем обозначения для следующих четырех счетных серий тождеств:

$$\begin{aligned}\alpha_k &: x_k y_k x_{k-1} x_k y_k \mathbf{b}_{k-1} \approx y_k x_k x_{k-1} x_k y_k \mathbf{b}_{k-1}, \\ \beta_k &: x x_k x \mathbf{b}_k \approx x_k x^2 \mathbf{b}_k, \\ \gamma_k &: y_1 y_0 x_k y_1 \mathbf{b}_k \approx y_1 y_0 y_1 x_k \mathbf{b}_k, \\ \delta_k^m &: y_{m+1} y_m x_k y_{m+1} \mathbf{b}_{k,m} y_m \mathbf{b}_{m-1} \approx y_{m+1} y_m y_{m+1} x_k \mathbf{b}_{k,m} y_m \mathbf{b}_{m-1}.\end{aligned}$$

Наконец, зафиксируем обозначения для следующих многообразий:

$$\begin{aligned}\mathbf{D}_k &= \text{var}\{x^2 \approx x^3, x^2 y \approx y x^2, \sigma_1, \sigma_2, \gamma_1, x^2 y_1 y_2 \cdots y_k \approx x y_1 x y_2 x \cdots x y_k x\}, \\ \mathbf{E} &= \text{var}\{x^2 \approx x^3, x^2 y \approx x y x, x^2 y^2 \approx y^2 x^2\}, \\ \mathbf{F}_k &= \text{var}\{x y x \approx x y x^2, x^2 y^2 \approx y^2 x^2, x^2 y \approx x^2 y x, \alpha_k\}, \\ \mathbf{H}_k &= \text{var}\{x y x \approx x y x^2, x^2 y^2 \approx y^2 x^2, x^2 y \approx x^2 y x, \beta_k\}, \\ \mathbf{I}_k &= \text{var}\{x y x \approx x y x^2, x^2 y^2 \approx y^2 x^2, x^2 y \approx x^2 y x, \gamma_k\}, \\ \mathbf{J}_k^m &= \text{var}\{x y x \approx x y x^2, x^2 y^2 \approx y^2 x^2, x^2 y \approx x^2 y x, \delta_k^m\}, \\ \mathbf{K} &= \text{var}\{x y x \approx x y x^2, x^2 y^2 \approx y^2 x^2, x^2 y \approx x^2 y x\}, \\ \mathbf{M} &= \text{var}\{x^2 y \approx y x^2, x^2 y z \approx x y x z x, \sigma_2, \gamma_1, \alpha_1\}, \\ \mathbf{SL} &= \text{var}\{x \approx x^2, x y \approx y x\}.\end{aligned}$$

Следствие 2. Многообразия $\mathbf{C}_n, \mathbf{D}_k, \mathbf{D}, \mathbf{E}, \overleftarrow{\mathbf{E}}, \mathbf{F}_k, \overleftarrow{\mathbf{F}}_k, \mathbf{H}_k, \overleftarrow{\mathbf{H}}_k, \mathbf{I}_k, \overleftarrow{\mathbf{I}}_k, \mathbf{J}_k^m, \overleftarrow{\mathbf{J}}_k^m, \mathbf{K}, \overleftarrow{\mathbf{K}}, \mathbf{L}, \mathbf{LRB}, \mathbf{M}, \overleftarrow{\mathbf{M}}, \mathbf{N}, \overleftarrow{\mathbf{N}}, \mathbf{RRB}, \mathbf{SL}$, где $n \geq 2$, $k \in \mathbb{N}$ и $1 \leq m \leq k$, и только они являются негрупповыми цепными многообразиями моноидов.

Множество всех негрупповых цепных многообразий моноидов, упорядоченных по включению, вместе с тривиальным многообразием, которое обозначается через $\mathbf{T}$, изображено на рис. 1.

В [5, следствие 2] отмечается, что всякое негрупповое цепное многообразие полугрупп содержится в некотором максимальном цепном многообразии, а всякое негрупповое не цепное многообразие полугрупп содержит некоторое *почти цепное* (т.е. минимальное не цепное) подмногообразие. Для многообразий моноидов аналоги каждого




Рис. 1: все негрупповые цепные многообразия моноидов

из этих свойств неверны. Из рис. 1 видно, что цепное многообразие $\mathbf{C}_n$ при $n > 2$ не содержится ни в каком максимальном цепном многообразии. Положим $\mathbf{O} = \text{var}\{x^2y \approx yx^2, x^2yz \approx xuxzx, \sigma_1, \sigma_2\}$. Из доказательства теоремы 2 вытекает

Следствие 3. *Если $\mathbf{X}$ — такое многообразие моноидов, что $\mathbf{L} \subset \mathbf{X} \subseteq \mathbf{O}$, то $\mathbf{X}$ не является цепным многообразием и не содержит никакого почти цепного подмногообразия.*

Чтобы сформулировать еще одно следствие, напомним, что многообразие универсальных алгебр называется *локально конечным*, если все его конечно порожденные алгебры конечны, и *конечно порожденным*, если оно порождается конечной алгеброй. Ясно, что если многообразие содержится в некотором конечно порожденном многообразии, то оно локально конечно. Из доказательства теоремы 2 вытекает

Следствие 4. *Произвольное негрупповое цепное многообразие моноидов содержится в некотором конечно порожденном многообразии и, в частности, является локально конечным.*

Отметим, что, в силу упоминавшихся выше результатов работы [15], существует континуум не локально конечных цепных многообразий групп.

В §4 диссертации изучаются специальные элементы в решетке $\mathbf{MON}$. Многообразие всех моноидов будем обозначать через $\mathbf{MON}$. Основными результатами §4 являются следующие две теоремы.

Теорема 3. *Для многообразия моноидов $\mathbf{V}$ следующие условия эквивалентны:*

- (i) $\mathbf{V}$ — модулярный, нижнемодулярный и верхнемодулярный элемент решетки $\mathbf{MON}$;
- (ii) $\mathbf{V}$ — нейтральный элемент решетки $\mathbf{MON}$;
- (iii) $\mathbf{V}$ совпадает с одним из многообразий $\mathbf{T}$, $\mathbf{SL}$ и $\mathbf{MON}$.

Теорема 4. *Для многообразия моноидов $\mathbf{V}$ следующие условия эквивалентны:*

- (i) $\mathbf{V}$ — модулярный и верхнемодулярный элемент решетки $\mathbf{MON}$;
- (ii) $\mathbf{V}$ — костандартный элемент решетки $\mathbf{MON}$;
- (iii) $\mathbf{V}$ совпадает с одним из многообразий $\mathbf{T}$, $\mathbf{SL}$, $\mathbf{C}_2$ и $\mathbf{MON}$.

Как мы уже отмечали выше, элемент решетки $\mathbf{SEM}$ является нейтральным тогда и только тогда, когда он является костандартным [4, теорема 1.3]. Теоремы 3 и 4 показывают, что в решетке $\mathbf{MON}$ эти свойства не эквивалентны.

Следующее утверждение дает существенную информацию о верхнемодулярных элементах решетки $\mathbf{MON}$. Многообразие моноидов называют *собственным*, если оно не совпадает с многообразием всех моноидов. Как и в случае полугрупп, мы будем называть многообразие моноидов *вполне регулярным*, если оно состоит из *вполне регулярных* моноидов (объединений групп).

Предложение 1. *Если собственное многообразие моноидов $\mathbf{V}$ является верхнемодулярным элементом решетки $\mathbf{MON}$, то $\mathbf{V}$ либо коммутативно, либо вполне регулярно.*

Поскольку кодистрибутивный элемент произвольной решетки является ее верхнемодулярным элементом, из предложения 1 следует, что любое собственное многообразие моноидов, являющееся кодистрибутивным элементом решетки $\mathbf{MON}$, либо коммутативно, либо вполне регулярно. Оказывается, что справедливо следующее

Предложение 2. *Всякое коммутативное многообразие моноидов является кодистрибутивным элементом решетки $\mathbf{MON}$.*

Предложения 1 и 2 сводят изучение верхнемодулярных и кодистрибутивных элементов решетки $\mathbf{MON}$ к вполне регулярному случаю.

В заключении диссертации изложены итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю профессору Б.М.Верникову за постановки задач, постоянное внимание к его работе, многочисленные полезные обсуждения и большую помощь при подготовке текстов статей и диссертации.

Список литературы

- [1] Айзенштат, А.Я. *О решетке многообразий полугрупп* / А.Я. Айзенштат, Б.К. Богута // Полугрупповые многообразия и полугруппы эндоморфизмов. – Л.: Ленингр. гос. педагогич. ин-т. – 1979. – С. 3–46.
- [2] Артамонов, В.А. *Цепные многообразия групп* / В.А. Артамонов // Тр. семинара им. И.Г.Петровского. – 1978. – Вып. 3. – С. 3–8.
- [3] Верников, Б.М. *Верхнемодулярные элементы решетки многообразий полугрупп. II* / Б.М.Верников // Фундам. и прикл. математика. – 2008. – Т. 14, No. 7. – С. 43–51.
- [4] Верников, Б.М. *Кодистрибутивные элементы решетки многообразий полугрупп* / Б.М.Верников // Изв. вузов. Математика. – 2011. – No. 7. – С. 13–21.
- [5] Суханов, Е.В. *Почти линейные многообразия полугрупп* / Е.В. Суханов // Матем. заметки. – 1982. – Т. 32, No. 4. – С. 469–476.
- [6] Шеврин, Л.Н. *Решетки многообразий полугрупп* / Л.Н.Шеврин, Б.М.Верников, М.В.Волков // Изв. вузов. Математика. – 2009. – No. 3. – С. 3–36.
- [7] Burris, S. *Embedding the dual of Π_m in the lattice of equational classes of commutative semigroups* / S.Burris, E.Nelson // Proc. Amer. Math. Soc. – 1971. – Vol. 30, No. 1. – P. 37–39.
- [8] Burris, S. *Embedding the dual of Π_∞ in the lattice of equational classes of semigroups* / S.Burris, E.Nelson // Algebra Universalis. – 1971. – Vol. 1, No. 2. – P. 248–254.
- [9] Evans, T. *The lattice of semigroup varieties* / T.Evans // Semigroup Forum. – 1971. – Vol. 2, No. 1. – P. 1–43.
- [10] Grätzer, G. *Lattice Theory: Foundation.* / G.Grätzer. – Basel: Springer Basel AG, 2011. – xxix+613 pp.

- [11] Gusev, S.V. *Cancellable elements of the lattice of semigroup varieties* / S.V. Gusev, D.V. Skokov, B.M. Vernikov // Algebra and Discrete Math. – 2018. – Vol. 26, No. 1. – P. 34–46.
- [12] Head, T. J. *The varieties of commutative monoids* / T. J. Head // Nieuw Arch. Wiskunde. III Ser. – 1968. – Vol. 16. – P. 203–206.
- [13] Jackson, M. *Finiteness properties of varieties and the restriction to finite algebras* / M. Jackson // Semigroup Forum. – 2005. – Vol. 70, No. 2. – P. 159–187; *Erratum to: Finiteness properties of varieties and the restriction to finite algebras* / M. Jackson // Semigroup Forum. 2018. – Vol. 96, No. 1. – P. 197–198.
- [14] Jackson, M. *Monoid varieties with extreme properties* / M. Jackson, E. W. H. Lee // Trans. Amer. Math. Soc. – 2018. – Vol. 370, No. 7. – P. 4785–4812.
- [15] Kozhevnikov, P. A. *On nonfinitely based varieties of groups of large prime exponent* / P. A. Kozhevnikov // Commun. Algebra. – 2012. – Vol. 40, No. 7. – P. 2628–2644.
- [16] Lee, E. W. H. *Varieties generated by 2-testable monoids* / E. W. H. Lee // Studia Sci. Math. Hungar. – 2012. – Vol. 49. – P. 366–389.
- [17] Lee, E. W. H. *Maximal Specht varieties of monoids* / E. W. H. Lee // Moscow Math. J. – 2012. – Vol. 12, No. 3. – P. 787–802.
- [18] Lee, E. W. H. *Almost Cross varieties of aperiodic monoids with central idempotents* / E. W. H. Lee // Beiträge zur Algebra und Geometrie. – 2013. – Vol. 54, No. 1. – P. 121–129.
- [19] Lee, E. W. H. *Inherently non-finitely generated varieties of aperiodic monoids with central idempotents* / E. W. H. Lee // Записки научных семинаров ПО-МИ. – 2014. – Т. 423. – С. 166–182.
- [20] Lee, E. W. H. *On certain Cross varieties of aperiodic monoids with central idempotents* / E. W. H. Lee // Results Math. – 2014. – Vol. 66, No. 2. – P. 491–510.
- [21] Pollák, Gy. *Some lattices of varieties containing elements without cover* / Gy. Pollák // Quad. Ric. Sci. – 1981. – Vol. 109. – P. 91–96.
- [22] Shaprynskiĭ, V. Yu. *Cancellable elements of the lattices of varieties of semigroups and epigroups* / V. Yu. Shaprynskiĭ, D. V. Skokov, B. M. Vernikov // Электрон. ресурс. <https://arxiv.org/abs/1810.01610> [P. 1–15.]
- [23] Shaprynskiĭ, V. Yu. *Cancellable elements of the lattice of overcommutative semigroup varieties* / V. Yu. Shaprynskiĭ, B. M. Vernikov // Электрон. ресурс. <https://arxiv.org/abs/1902.04576> [P. 1–9.]
- [24] Skokov, D. V. *On modular and cancellable elements of the lattice of semigroup varieties* / D. V. Skokov, B. M. Vernikov // Сиб. электрон. матем. изв. 2019. Т. 16. С. 175–186.

- [25] Vernikov, B. M. *Upper-modular elements of the lattice of semigroup varieties* / B. M. Vernikov // Algebra Universalis. – 2008. – Vol. 59, No. 3–4. – P. 405–428.
- [26] Vernikov, B. M. *Special elements in lattices of semigroup varieties* / B. M. Vernikov // Acta Sci. Math. (Szeged). – 2015. – Vol. 81, No. 1–2. – P. 79–109.
- [27] Vernikov, B. M. *Upper-modular and related elements of the lattice of commutative semigroup varieties* / B. M. Vernikov // Semigroup Forum. – 2017. – Vol. 94, No. 3. – P. 696–711.
- [28] Volkov, M. V. *Young diagrams and the structure of the lattice of overcommutative semigroup varieties* / M. V. Volkov // In: P. M. Higgins (ed.), Transformation Semigroups. Proc. Int. Conf. Held at the Univ. Essex. Colchester: University of Essex. – 1994. – P. 99–110.
- [29] Volkov, M. V. *Modular elements of the lattice of semigroup varieties* / M. V. Volkov // Contrib. General Algebra. – 2005. – Vol. 16. – P. 275–288.
- [30] Wismath, S. L. *The lattice of varieties and pseudovarieties of band monoids* / S. L. Wismath // Semigroup Forum. – 1986. – Vol. 33, No. 1. – P. 187–198.
- [31] Zhang, W. T. *A new example of limit variety of aperiodic monoids* / W. T. Zhang, Y. F. Luo // Электрон. ресурс. <https://arxiv.org/abs/1901.02207> [P. 1–16.]

Публикации автора по теме диссертации

Статьи, опубликованные в журналах из списка ВАК

- [32] Гусев, С. В. *О решетке надкоммутативных многообразий моноидов* / С. В. Гусев // Изв. вузов. Математика. – 2018. – No. 5. – С. 28–32.
- [33] Gusev, S. V. *Special elements of the lattice of monoid varieties* / S. V. Gusev // Algebra Universalis. – 2018. – Vol. 97, No. 2. – Article 29. – P. 1–12.
- [34] Gusev, S. V. *Chain varieties of monoids* / S. V. Gusev, B. M. Vernikov // Dissert. Math. – 2018. – Vol. 534. – P. 1–73.

Другие публикации

- [35] Гусев, С. В. *Нейтральные и константные элементы решетки многообразий моноидов* / С. В. Гусев // Междунар. конф. «Мальцевские чтения»: Тез. докл. Новосибирск. – 2017. – С. 145.

- [36] Гусев, С.В. *О кодистрибутивных и верхнемодулярных элементах решетки многообразий моноидов* / С.В.Гусев // Современ. проблемы математики и ее приложений: тезисы Междунар. (49-й Всеросс.) молодёжной школы-конф. Екатеринбург. – 2018. – С. 12.
- [37] Gusev, S. V. *Chain varieties of monoids* / S. V. Gusev // Groups and graphs, algorithms and automata: Abstracts of the Int. Conf. and PhD Summer School. Ekaterinburg. – 2015. – P. 52.
- [38] Gusev, S. V. *On the lattice of overcommutative varieties of monoids* / S. V. Gusev // Groups and graphs, metrics and manifolds: Abstracts of the Int. Conf. and PhD-Master Summer School. Ekaterinburg. – 2017. – P. 54.